



定期予防接種 (法律で定められた予防接種で、料金は無料です。)

R5. 4. 1 改正

種別	接種回数	受けられる時期 (標準的な時期)	標準的な接種間隔
ロタウイルス ※経口投与 	2回 (1価ワクチン)	標準的には初回接種を <u>生後2か月に至った日から出生14週6日後までに</u> します。	生後6週0日から24週0日まで 生後6週0日から32週0日まで
	3回 (5価ワクチン)		
Hib(ヒブ) 	初回 (3回)	<u>生後2か月以上60か月 (5歳) に至るまで (初回接種は生後7か月までに開始) 7か月以上で開始する場合は接種回数が異なります。</u>	27日 (4週) (医師が認める場合は20日) ~56日 (8週)
	追加 (1回)		初回3回終了後、7月~13月
小児肺炎球菌 	初回 (3回)	<u>生後2か月以上60か月 (5歳) に至るまで (初回接種は生後7か月までに開始、追加接種は生後12か月~15か月までに受ける) 7か月以上で開始する場合は接種回数が異なります。</u>	27日 (4週) 以上
	追加 (1回)		初回3回終了後、60日以上
B型肝炎 	3回	<u>生後1歳に至るまで (生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで)</u>	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から140日以上経過した後に1回接種する
四種混合 (DPT-IPV) <small>ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ</small> 	1期初回 (3回接種)	<u>生後2か月から90か月 (7歳6か月) に至るまで (初回接種は生後2か月から12か月までに受ける)</u>	20日~56日 (3~8週間)
	1期追加 (1回接種)		初回3回終了後、6月以上 (初回終了後12か月~18か月が望ましい)
BCG 	1回	<u>生後12か月未満 (生後5か月に達した時から8か月に達するまで)</u>	
水痘 	2回	<u>生後12か月から36か月 (3歳) に至るまで (生後12か月から15か月までに1回目を接種し、1回目の接種後6か月~12か月までの間隔をおいて2回目を接種)</u>	3か月以上
MR (麻しん・風しん) 	1期 (1回接種)	<u>生後12か月から24か月未満</u>	
日本脳炎 	1期初回 (2回接種)	<u>生後6か月から90か月 (7歳6か月) 未満 (1期初回は3歳に達した時から4歳に達するまで、1期追加は4歳に達した時から5歳に達するまで)</u>	6日~28日 (1~4週間)
	1期追加 (1回接種)		1期初回接種後6か月以上

 **任意予防接種** (定期接種以外の予防接種。医師とご相談のうえ、保護者の判断で受けてください。接種費用の一部又は全額を助成します。)

・おたふくかぜ  …1歳から 等

 ロタウイルスワクチンを除く  は、接種後4週間後の同じ曜日まで他の  を接種することができません。